



NOBILIN FETT-BLOCKER

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie vor der Einnahme von NOBILIN FETT-BLOCKER diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

Was ist NOBILIN FETT-BLOCKER?

NOBILIN FETT-BLOCKER ist ein registriertes Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft. NOBILIN FETT-BLOCKER enthält Ficuntin®, einen aus Pflanzen gewonnenen natürlichen Faserkomplex von *Opuntia ficus indica*. NOBILIN FETT-BLOCKER ist reich an löslichen und nichtlöslichen Fasern und hat eine sehr hohe Bindungsaffinität für Fette. In vitro Prüfungen haben gezeigt, dass NOBILIN FETT-BLOCKER bis zu 36 % der mit der Nahrung aufgenommenen Fette bindet.

Hauptwirkung von NOBILIN FETT-BLOCKER

NOBILIN FETT-BLOCKER wird als pflanzlicher Fettbinder angewandt zur Unterstützung

- der allgemeinen Gewichtskontrolle und zur Reduzierung von Übergewicht
 - einer Reduktionsdiät bei Übergewicht bzw. zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer fettbewußten Ernährung.
 - der Verminderung der Kalorienaufnahme aus den Nahrungsfetten. Die nichtlöslichen Fasern in NOBILIN FETT-BLOCKER binden im Magen Fett aus der Nahrung und bilden einen voluminösen Fett-Faser-Komplex. Die wasserlöslichen Fasern in NOBILIN FETT-BLOCKER bilden ein flüssiges Gel, welches den Fett-Faser-Komplex umschließt.
- Der so stabilisierte Fett-Faser-Komplex wird durch die unterschiedlichen pH-Werte in Magen und Darm nicht beeinflusst und im Darm nicht aufgenommen, sondern natürlich mit dem Stuhl ausgeschieden.

Dadurch wird die Kalorienaufnahme aus Nahrungsfetten reduziert.

- der Verbesserung der Cholesterinwerte im Blut durch die Reduzierung der Fettaufnahme aus der Nahrung.

Anwendung

- Gewichtsreduktion: Vor oder während der Hauptmahlzeiten jeweils 2 - 3 Tabletten NOBILIN FETT-BLOCKER verzehren.
- Gewichtskontrolle: Vor oder während der Hauptmahlzeiten jeweils 1 - 2 Tabletten NOBILIN FETT-BLOCKER verzehren.
- Tablette nicht zerbeißen. Die Tablette soll sich nicht im Mund zersetzen.
- Nicht mehr als 9 Tabletten pro Tag verzehren.

Eine Überdosierung von NOBILIN FETT-BLOCKER verbessert die Wirkung nicht, sie kann aber mögliche Nebenwirkungen fördern.

Nur bei vorschriftsgemäßer Einnahme kann NOBILIN FETT-BLOCKER richtig wirken.

Im Einklang mit der Medizinproduktrichtlinie 93/42/EWG wird empfohlen, nach 30 Tagen der Einnahme dieses Medizinproduktes jeweils eine Pause von 3 - 5 Tagen ohne Einnahme einzuhalten.

Zwar ist der Verzehr von NOBILIN FETT-BLOCKER ein wichtiger Schritt zur Kontrolle Ihres Gewichtes, doch sollte das Präparat immer als Teil eines Gesamtplans zur Gewichtskontrolle betrachtet werden.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- Für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
- Kinder und Jugendliche sollten NOBILIN FETT-BLOCKER nur nach ärztlicher Rücksprache anwenden.
- Verwenden Sie NOBILIN FETT-BLOCKER nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit.



NOBILIN FETT-BLOCKER

- Nicht einnehmen bei einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Verwenden Sie NOBILIN FETT-BLOCKER nicht, wenn Ihr BMI unter 18,5 liegt.
- Es wird empfohlen, zwischen dem Verzehr von NOBILIN FETT-BLOCKER und der Pille zur Empfängnisverhütung, fettlöslichen Arzneimitteln oder Vitaminpräparaten einen Abstand von 2 Stunden einzuhalten, obwohl gezeigt wurde, dass NOBILIN FETT-BLOCKER die Absorption der fettlöslichen Vitamine A und E nicht beeinflusst.
- NOBILIN FETT-BLOCKER enthält Spuren von Oxalsäure, welche natürlicherweise in zahlreichen grünen Gemüsesorten vorkommt. Bei Nierenerkrankungen oder Nierensteinen sollten Sie dieses Produkt deshalb nicht regelmäßig verzehren.
- Da NOBILIN FETT-BLOCKER den Blutzuckerspiegel beeinflussen kann, müssen Diabetiker eventuell ihre Behandlung anpassen, um eine Hypoglykämie zu vermeiden. Bitte fragen Sie Ihren behandelnden Arzt.
- Im Zweifel, oder wenn Sie cholesterinsenkende oder andere Arzneimittel einnehmen, sollten Sie vor der Einnahme dieses Produktes Ihren Arzt oder Apotheker fragen.

Hinweis

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) der Klasse IIa, empfehlen wir, nach 30 aufeinanderfolgenden Therapietagen mit NOBILIN FETT-BLOCKER eine Pause von 3 - 5 Tagen einzuhalten. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Zusammensetzung von NOBILIN FETT-BLOCKER

Wirkstoff: Feigenkaktuspulver aus Pflanzen gewonnener natürlicher Faserkomplex.

Hilfsstoffe: mikrokristalline Cellulose, Sorbitol*, Cellulosepulver, Magnesiumstearat, Natriumstärkeglykolat, Siliciumdioxid.

** kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.*

NOBILIN FETT-BLOCKER enthält keine Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel oder Farbstoffe und ist frei von Milchzucker, Jod, Gluten und Cholesterin. NOBILIN FETT-BLOCKER wird auf natürlicher Basis hergestellt und ist frei von tierischen Rohstoffen. Leichte Schwankungen in Farbe und Geschmack haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.

Aufbewahrung

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Zu verwenden bis: siehe Angaben auf der Verpackung.

Hersteller

nurpha swiss GmbH
Schützenstr. 38 o
CH 9100 Herisau

Vertrieb

MEDICOM Pharma GmbH
Feringastr. 4
85774 Unterföhring

Stand der Information

Januar 2013

Tel.: **0800 - 73 77 730**

Fax: **0800 - 73 77 700**

www.medicom.de

GP20176;5

CE 1254


MEDICOM®